

26.05
27.08 2023



TÄUSCHEND ECHT!

WËLL ORCHIDEËËN
ZU LËTZEBUERG



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Culture

VIRWUERT

Op den éischte Bléck wierke se tatsächlech täuschend echt: Wéi wann et sech ëm eng bunt gemëschten Usammlung vu grad an der Natur gepléckten Orchideeëbléien handele géif, déi aus iergendengem exzentresche Grond hei hannert Plexiglas ausgestellt sinn. Mee dës Planze hu guer näischt Fräisches, näischt originär Vegetaresches u sech. Och sti se net nëmmen hannert duerchsichtegem Konschtstoff, mee si besti selwer aus syntheteschem Material. Et sinn naturgetrei Planzemodeller.

Ass dëst elo e weidert Unzeeche vum redoutéierten Triumph vum Kënschtlechem iwwert d’Natur – beschtefalls eng gelungen Täuschung vun de Sënner – well d’Konschtstoffmodeller aus der Ausstellung méi liwensecht wirken wéi déi soignéiertst hollännesch Stëlliewen?

Esou geet et wuel munche Besucher duerch de Kapp, wa se am ‘natur musée’ virun de Vitrine mat den eenzegaartege, vum Planzemodeller Sebastian Brandt, hiergestallte Kreatiounen stinn. Sollt et net grad an enger Ausstellung iwwer bedroten Orchideeënaarten drëms goen, dës och an hirer ganzer Natierlechkeet ze bewonneren?

D’Vergänglichlechkeet gehéiert elo mol zum Wiese vu jiddwer Planzebléi. Däischer Muséeëssäll eegne sech einfach net duerfir, lieweg Planzen iwwer eng länger Zäit auszustellen. Dat gëllt an éischer Linn fir all d’Aarten ënner Naturschutz, zu deenen all déi wëll Orchideeë vu Lëtzebuerg gehéieren. Firwat Versich scheitert géifen, wëll Orchideeë fir eng Ausstellung kënschtlech ze züchten, erkläert sech séier iwwer d’Biologie vun dësen Planzen: Den obligatoresche symbiontesche Champignon, ouni dee keng eenheemesch Orchidee iwwerliewe kann, léisst sech nämlech net aus dem Heemechtbuedem vun der Planz mat transplantéieren.





Genuch Grënn also, déi wëll Orchideeën am Kader vun dëser Ausstellung wéi an Zäit an a Bernstein agefrueren Insekten virstellen. Waren et an der Vergaangenheet déi konschtvoll Illustratiounen aus de Kräider- a Bestëmmungsbücher, déi gehollef hunn, op onscheinbar a flüchteg Detailler opmierksam ze maachen, sinn et elo déi genial Imitatiounen vum Sebastian Brandt, déi déi faarweg Bléieblieder, dat opfälleg zur Lëps vergréissert Krouneblat an déi fleescheg Wuerzelstäck vun de Planzen zu Wonnere vun der Natur stiliséieren. E generéisen Don huet dem 'natur musée' et erlaabt e puer Exempläre fir seng Modellsammlung ze kafen, fir se elo dem Public ze presentéieren.

Modeller sinn awer méi wéi just konschtvoll Presentatiounsmaterial. Zënterdeem botanesch Modeller am 16. Joerhonnert vu Botaniker bei Konschthandwierker an Optrag gi sinn, si se als "wëssenschaftlech Modeller" betruecht ginn, déi fir botanesch Uleedungen op héchstem Niveau gebraucht konnte ginn. Genue esou wéi déi héichwäerteg Zeechnungen aus de Bestëmmungsbücher sinn d'Modeller an der Regel Kompositiounen vun e puer Exemplare vun der selwechter Aart, fir déi charakteristesche Aspekter vun der Planz ze erfassen, andeems Detailler erausgefiltert goufen, déi d'Identifizierung vun der Planz um Terrain behënnert hätten.

Zousätzlech zu den ausgestallte Beleege vu wëllen Orchideeën aus der hausegener Sammlung an den Ausstellungstexter, déi mat Hëllef vum Naturkundemuseum Erfurt entstanen sinn, bitt d'Ausstellung "Täuschend echt! Wëll Orchideeën zu Lëtzebuerg" mat hire Modeller also en eenzegaartegen Abléck an déi faszinant Welt vun dëser "Bijoue vun onser Natur". Loosst Iech also ouni Hemmung vun hirer Schéinheet verzaubern!

Patrick Michaely

Direkter

Nationale Musée fir Naturgeschicht – 'natur musée'

MERCI

D'Ausstellung "Täuschend echt! Wëll Orchideeën zu Lëtzebuerg" wär ouni d'Ënnerstëtzung vu ganze ville Mënschen net zustane komm. Et sollen hei fir d'éischt déi vill verschidde Servicer vum natur musée genannt ginn, deenen hir Zesummenaarbecht fir d'Entstoe vun dëser Ausstellung onbedéngt néideg war. Besonnesch d'Mataarbechterinnen an d'Mataarbechter vum Service muséographique, vum Service technique, vum Service éducatif, vun de Sektione Botanik an Zoologie an och fräiwëlleg wëssenschaftlech Mataarbechter hunn déi läscht Méint hir Begeeschterung, hire Fläiss an hiert Fachwëssen abruecht fir des Ausstellung ze gestalten.

E ganz besonnesche Merci geet un de Sebastian Brandt (Reco-Brandt) an d'Kolleege vum Naturkundemuseum Erfurt, déi eis am Virfeld dat ganz Material vun hirer Ausstellung "Juwelen der Natur – Orchideen in Thüringen" zur Verfügung gestallt hunn an eis erlaabt hunn et fir Lëtzebuerg unzepassen an ëmzegestalten.

En härezeche Merci och un déi vill Fotografen a Fotografinnen, déi eis hir Biller zur Verfügung gestallt hunn, fir dass d'Schéinheet vun den heemeschen Orchideeën sou prächttvoll konnt duergestallt ginn: Sebastian Brandt, Guy Conrady, Nathalie Grotz, Jan Herr, Wolfgang Hock, Alain Hoffmann, Karel Kreutz, Yves Krippel, Max Lauff, Fernand Lommer, Marianne Majerus, Jean-Marie Mangen, Jim Meisch, Georges Moes, Mikka Mootz, Ronny Mozek, Simone Schneider, Eric Threinen, Jean-Paul Wolff, Peter Zschunke.

Villmools Merci dem Georges Moes an der Stëftung natur&ëmwelt fir hire wichtege Bäitrag zum Thema Schutz an Erhalt vun den Orchideeën.

Zu gudder Lescht ee grouse Merci un d'Ekippe vun de Gardiens, de Guiden an och der Botzekipp, déi dofir suergen, dass Är Visite vun der Ausstellung zu engem agreabelen Erleefnes gëtt.

ALEEDUNG

Eng wichteg Aufgab vum natur musée ass d'Vermëttele vu Wëssen iwwert d'Aarten, déi zu Lëtzebuerg virkommen, hir Liewensweis, hir Verbreedung a wéi si gefäerdet sinn. Heibäi kommen d'Planze leider dacks ze kuerz. Weder gedréchent a gepressten Herbiersbeleege aus de Sammlunge vum Musée, nach am Alkohol ageluechten, verblatzte Planzendeeler eegen sech fir d'Villfalt an d'Schéinheet vun der Flora duerstellen a scho guer net fir de Publikum ze begeeschteren. Mat neiste Preparatiounsmethoden ass et elo awer fir d'éischt Kéier méiglech fir Planzen an hirer ganzer natierlecher Pruecht – Täuschend echt! – duerstellen.

An der Ausstellung “Täuschend echt! Wëll Orchideeën zu Lëtzebuerg” presentéiert den natur musée seng Sammlung vu liewensechten Nobildungen vun deene 45 heemeschen Aarte vun Orchideeën a gëtt en Abléck an déi faszinéierend Villfalt vun där Planzefamill.

Orchideeë kennt bal jiddereen. Déi beléiften Zëmmerplanzen mat deene prächtigen opfälleg gefierfte Bléien fënnt een an all Blummebuttek a si stinn op ville Fënsterbänken. Dass awer och zu Lëtzebuerg an der Natur wëll Orchideeë wuessen, ass awer manner bekannt. Dobäi eegen sech grad déi well wuessend Orchideeën exzellent fir déi naturno aarteräich Liewensraum unzeweisen, déi mir am Kader vun der weltwäiter Biodiversitéitskris musse schützen an erhalen.

Déi heemesch Orchideeën hunn sech un ganz verschidde Liewensraum ugepasst. Déi eng kennen am däischterste Bësch bal ouni Luucht auskommen, anerer erdroen déi extrem Dréchent a staark Sonnestralung um Dréchewues, nach anerer kënnen a fiichten oder souguer suppege Wäsen iwwerliewen. Gemeinsam hunn all Liewensraum vun Orchideeën hir Nährstoffarmut, well Orchideeë kënnen mat ganz wéineg Nährstoffer eens ginn. Dobäi hëllefen hinnen déi eng Bindung u Wuerzelpilzen, op déi si scho fir ze kënnen ugewise sinn. An hiren ënnerirdeschen Späicherorganen kënnen si Reserven uleeën, déi hinnen et erlaben am gönschtege Moment séier zur Bléi ze kommen.





TÄUSCHEND ECHT!

WËLL ORCHIDEEËN ZU LËTZEBUERG

Orchideeë sinn mat iwwer 30.000 bekannten Aarten déi zweetgréisst Planzefamill op der Welt. Si si Meeschtere vun der Täuschung, déi hir Bestëbser mat aussergewöhnliche Methoden ulackelen.

Déi eenzegaarteg Villfalt a Pruecht vun den Orchideeëbléien fascinéieren d'Menschen zanter Joerhonnerten. Déi meescht Mënsche kennen Orchideeën als dekorativ Zëmmerplanzen op der Fësterbänk. Dës Züchtungen vun urspringlech tropeschen Orchideeën mat iwwergrousse Bléien an a ville Faarwvariatiounen ginn zu Milliounen a sterile Reagenzgläser op Nierléisungen kënschtlech produzéiert.

Zu Lëtzebuerg sinn 45 Arten Orchideeën a verschiddene Liewensraim eenheemesch; dovu sinn der neng bei eis leider schon ausgestuerwen. Orchideeë weisen ganz ëmpfindlech op biologesch intakt Liewensraim hinn a wou si virkommen fënnt een oft nach aner seelen Déieren- a Planzenaarten.



ENG EENZEGAARTEG SAMMLUNG

Déi präisgekréinte botanesch Modeller vum Sebastian Brandt (Fa. Reco-Brandt, Kornhochheim, Däitschland) sinn eenzegaardeg Korschhaarz-Ofgëss vun echte Planzen. Mat Hëllef vun enger neiaarterger Method ginn si an opwenneger Klengaarbecht handwierklech produzéiert. Sou entstinn fir d'éischt Kéier botanesch Exponaten an enger héijer Qualitéit.

All Einzeldeeler vun de Planzen, wéi Blieder, Bléien a Stiller ginn a speziell Silikonbléck agegoss. Doraus entstinn Géissformen, déi mat faarwege Korschhaarz-Mëschunge gefëllt ginn. Beim chemeschen Aushäerden entsteet mikroskopesch exakt an dauerhaft Ofgëss vun deene verschiddene Planzendeeler, déi dann zum fäerdege Modell zesumme montéiert ginn. Nodeems si iwwerschafft goufen an eng Schlusskoloratioun kruten, stëmmen d'Reco-Brandt Orchideeën-Nobildungen a Gestalt a Faarf exakt mat dem Planzen-Original iwwereneen.




TYPËSCH ORCHIDEE

D'Bléie vun den Orchideeën, déi zu Lëtzebuerg wëll wuesse kennen sech mat hirer Gréisst a Faarwepruecht meeschtens net mat de bekannten Orchideeën-Zuchtformen oder den tropeschen Aarte moossen. Si hunn awer dee selwechten 3-zielegen Opbau: déi 3 baussenzeg Bléieblieder si meeschtens gläichaaerteg, dat Mëttelst vun deenen dräi bannenzege Bléieblieder ass vergréissert a bilt déi oft opfälleg geformte Lëps. An der Knosp steet déi Lëps nach uewen, ma d'Bléi dréit sech ëm 180° , sou dass si dann no ënnen a no vir geriicht ass.

Aner typesch Mierkmoler vun den Orchideeë sinn déi riicht, onverzweigt Wuessform, déi ongedeelt längelzeg oder oval Blieder mat parallele Blatnerven an déi ënnerierdesch Späicherorganer, entweder eng Koppel vu Wuerzelknollen oder wéineg verzweigte Rhizomer.

D'Stëbsblieder bilden zesumme mat dem Griffel eng Sail an d'Polle sinn zu Pollinie verklompt, déi vun de Bestëbser als Ganzt verbreet ginn. Orchideeë bilde Kapsle mat ganz vil mikroskopesch klengem Som ouni Närgewebe, dee fir ze kéngen op Mykorrhiza-Pilzen ugewisen ass.




Stëbsblieder mat
dem Griffel zu engem
Säil verwuesst

Still onverzweigt




TYPËSCH





Pollen zu Pollinie verpecht: de ganze Polle gëtt an enger Kéier matenee verdeelt

Eng Koppel
Wuerzelknollen oder
fleescheg, méi oder
manner verzweigte
Wuerzelstäck (Rhizomen)
als Späicherorganer;
aus der enger Knoll
entwéckelt sech am
Fréihjoer de Bléiendriww,
déi aner späichert Reserve
fir dat nächst Joer a Form
vu Stäerkt.



ORCHIDEE

Liewensgemeinschaft mat Mykorrhiza-Pilzen: d'Myzelfiedem vun de Pilzen wuessen an de Som an an d'Wuerzele vun den Orchideeën eran; dës kritt vum Pilz Nährstoffer, déi si net selwer bilde kann.



Som mikroskopësch kleng,
ouni Närgewebe



An der Rouder Lëscht vun de Gefässplanze vu Lëtzebuerg sinn d'Orchideeën a folgende Kategorië klasséiert fir hire Gefährdungsstatut anzuschätzen (no IUCN).

- an eisem Land ausgestuerwen **RE**
- staark gefährdet a vum Ausstierwe bedrot **CR**
- gefährdet **EN**
- bedrot **VU**
- just net bedrot **NT**
- net bedrot **LC**

PLÉCKE VERBUEDEN!


Zu Lëtzebuerg sinn all Orchideeë geschützt. Si däerfe weder gepléckt nach zerstéiert oder soss geschiedegt ginn. Fir dass d'Aarten op Dauer iwwerliewe kennen, geet dat awer net duer. Och déi passend Liewensraim mussen erhale bleiwen.

Dréchwues, nährstoffaarm Fiichtwisen an aner moer Opelandstanduerter weisen e grouse Räichtum un Aarte mat vill spezialiséierten Déieren a Planzen (wéi z.B. Orchideeën). Déi gréisst Gefor fir des wäertvoll Liewensraim si feelend oder net genuch Notzung oder Fleeg, déi direkt Zerstéierung duerch Düngen a méi heefegt Méien an den Nährstoffantrag vun ugrenzenden intensiv genotzte Flächen. Vill Gebidder léien haut isoléiert a fragmentéiert an hu wéineg Fläch, sou dass de genetischen Austausch tëschent de Standuerter feelt a vill kleng Reschtpopulatione laangfristeg nëmme wéineg Iwwerlieweschancen hunn.

Vill Standuerter vun Orchideeë leien an Naturschutzgebidder oder a geschützte Liewensraim. D'Fläche mussen awer regelméisseg gefleegt gi fir dass d'Orchideeën op Dauer erhale bleiwen. Dës Fleeg gëtt vun de Gemengesyndikater fir Naturschutz, de Biologesche Statiounen, der Naturverwaltung mat de Revéierfierschter a vu privaten Naturschutzorganisatione geleescht.

ORCHIDEEEVIRKOMMEN

AM BËSCH (FOR)





LIEWEN AM BËSCH

Verschieden Orchideeënaarten si perfekt un d'Liewen am däischtere Bësch ugepasst. Déi gréisste Vilfalt fënnt sech op Lichtungen a laanscht d'Bëschränner, wou méi Luucht hikënnt. Orchideeë kommen zu Lëtzebuerg an dëse Bëschttype fir:

- Biche bilden op dem Lëtzebuerger Sandsteen naturno Halebëscher, op deenen hire Lichtunge sech eng räich Krautschicht entwéckelt.
- Op Kallekbiedem, wéi iwwer dem Muschelkallek an der Muselgéigend oder iwwer dem Dogger an der Minett am Süde vu Lëtzebuerg, steet de Kallek-Bichebësch.
- Den aarteräichen Eechen-Houbichebësch entwéckelt sech op méi leemege Biedem, do wou et fir d'Bich ze naass oder ze dréche gëtt.
- Op e puer no Süden ausgeriichten Häng fënnt ee méi e lichten Dréchebësch mat Eechen, deen et gär méi waarm huet.
- Natierlech Nolenholzbëscher kommen zu Lëtzebuerg net vir. Fiichten a Kifere goufen awer op ville Plazen ugeplant.



GROUSST ZWEEBLAT

Neottia ovata

DE: Großes Zweiblatt

FR: grande listère

EN: common twayblade



VI-VII

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Sebastian Brandt

Dat Grousst Zweeblatt ass liicht u sengen zwee groussen, bal géigestännege Blieder ze erkennen. Eng Sträif un der Lëps vun den onscheinbare Bléie scheet räichlech Nektar of a lackelt domat Insekten un. Un de Pollepäck quëllt scho bei liichter Beréierung eng kleng Drëps Läim eraus, déi an Zäit vu Sekonnen de Pollepäck um Insektekapp upecht. D'Grousst Zweeblatt ass am Guttland ganz heefeg a wisst a fiichte Bëscher an op kallekhaltegem Dréchewues.





VULLENNASCHT- ZWEEBLAT

Neottia nidus-avis

DE: Vogel-Nestwurz

FR: néottie nid-d'oiseau

EN: bird's-nest orchid



VI-VII

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Eric Threinen

D'Vullennascht-Zweeblatt verdankt säin Numm senge Wuerzelen, déi wéi bei engem Vullennascht anenee verflecht sinn. Des Orchidee erniert sech nëmme iwwert déi ënnerierdesch Fiedem vun hirem Pilzpartner an ass onofhängeg vum Liicht. Si bilt bal kee Blattgréng an erschéngt dofir brongelzeg. Si wiest virun allem a schiedege Laf- an Nolebëscher am Guttland.





OUNIBLAT-GEESCHTERORCHIDEE

Epipogium aphyllum

DE: Blattloser Widerbart

FR: épipogon sans feuilles

EN: ghost orchid

🌸 VI-VIII

CR EN VU NT LC

Och d'Ouniblat-Geeschterorchidee gesäit gielzeg-brong aus, well si guer kee Blatgréng bilt an sech nëmmen iwwert hir Pilzpartner erniert. Just onreegelméisseg, a jore mat vill Reen, béi héijer Loftfiichtegkeet a Wäermt sinn d'Bléi vun der Geeschterorchidee am Juli fir e puer Deeg ze gesinn. De Rescht vun der Zäit leeft des Aart ënnerierdesch, verstoppt am fiichte Mulch vun ale Bichebëscher. Dat eenzezt aktuell bekannt Virkommen vun der Ouniblat-Geeschterorchidee am ganze Benelux ass an engem Hang-Bichebësch bei Walfer.





Mof LIMODORE

Limodorum abortivum

DE: Violetter Dingel

FR: limodore violette

EN: violet limodore



V-VI

RE

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Eric Threinen

Di Mof Limodore bilt keng gréng Blieder. Seng Bléie ginn nëmme seele ganz op, d'Befruchtung geschitt dacks andeems si sech selwer bestëbst. Déi Orchidee koum am 19. Joerhonnert zu Lëtzebuerg op méi Plaze vir, ënner anerem ronderëm d'Haaptstad an tëscht Gréiwemaacher an Iechternach. De leschte bekannten Nowäis war 1965 op der Hoelt bei Rouspert.





GIEL VENUSSCHLAPP

Cypripedium calceolus

DE: Frauenschuh

FR: sabot-de-Vénus

EN: yellow lady's slipper orchid



V-VI

RE

CR

EN

VU

NT

LC

photo : Eric Threinen

Déi liichtend giel kesselfërmeg Lëps vun der Venusschlapp lackelt Insekten un, déi un de glatte Wänn keen Halt fannen an an d'Fal rutschen. Deen eenzege Wee an d'Fräiheet féiert duerch en enke Schloff, laanscht d'Stëbsblieder an d'Narb, woubäi d'Bléi bestëbst gëtt. D'Giel Venusschlapp wiisst a lichte Laf- a Mëschbëscher op nährstoffarme Kallekbiedem. Zu Lëtzebuerg kouw si an de Bëscher ëm Gréiwemaacher vir, gouf awer zanter 1957 net méi gesinn.





photo : Sebastian Brandt

WÄISS KRÄIZBLUMM

Platanthera bifolia

DE: Weiße Waldhyazinthe

FR: platanthère à deux feuilles

EN: lesser butterfly-orchid

🌸 VI-VII

CR EN VU NT **LC**

D'Kräizblumme lackele mat séissem Doft nuetsaktiv Päiperleken un. Hire laange Spuer ass typesch fir Orchideeën, déi vu Päiperleke bestëbst ginn. D'Pollepäck vun der Wäisser Kräizblumm sti parallel an no beienee virun der Entrée an de Spuer. Si bleiwen un de laange Rüssele vun de Schwärmer pechen. Des Aart kennt a lichte Bëscher, op moren an op fiichte Wäsen, souwuel am Éislek wéi och am Guttland vir.





photo : Sebastian Brandt

GRÉNGELZEG KRÄIZBLUMM

Platanthera chlorantha

DE: Grünliche Waldhyazinthe

FR: platanthère à fleurs verdâtres

EN: greater butterfly-orchid

 V-VII

CR EN VU NT **LC**

Déi zwou heemesch Kräizblummenaarte sinn u verschidde Päiperleksfamilljen ugepasst. Di Gréngelzeg Kräizblumm pecht hir Pollepäck, déi an engem breede Wénkel ausernee sti virun allem Eilepäiperleken op hir Netzaen. Si wisst a lichte Bëscher, um Bëschränd an op Kallekdréchewues, virun allem am Guttland.





photo : Eric Threinen

BLEECHE BËSCHVILLCHEN

Cephalanthera damasonium

DE: Bleiches Waldvögelein

FR: céphalanthère à grandes fleurs

EN: white helleborine

🌸 V-VI

CR EN VU NT **LC**

Bëschaarte wéi de Bleiche Bëschvillche kënne mat Hëllef vun de Pilzfiedem an hire Wuerzelzellen a Liewensraim mat nëmme ganz wéineg Liicht wuessen. De Bleiche Bëschvillche kënnt heefeg op Kallekbiedem a lichte Laf- an Nolebëscher am Guttland vir.





photo : Eric Threin



LAANGBLIEDEREGE BËSCHVILLCHEN

Cephalanthera longifolia

DE: Schwertblättriges Waldvögelein

FR: céphalanthère à feuilles en épée

EN: sword-leaved helleborine



V-VII

CR

EN

VU

NT

LC

De Laangbliederege Bëschvillche gläicht dem Bleeche Bëschvillchen, ënnerscheet sech awer duerch seng laang schmuel Blieder. Well en net sou staark u Kallekbiedem gebonnen ass, fënnt een e souwuel am Guttland wéi och am Éislek a Laf- oder Nolebëscher.





photo : Eric Threinen

ROUDE BËSCHVILLCHEN

Cephalanthera rubra

DE: Rotes Waldvögelein

FR: céphalanthère rose

EN: red helleborine



VI-VII

CR

EN

VU

NT

LC

Di grouss Bléie vum Roude Bëschvillchen erënnere mat hire spatze Bléieblieder un d'Silhouette vun engem Villchen dee flitt, dohier och den Numm. Dës typesch Orchidee vu kallekräiche lichte Bëscher fënnt ee méttlerweil just nach an de Gebidder vun de fréiere Minièren am Süde vu Lëtzebuerg.





BREETBLIEDEREG HARESPELORCHIDEE

Epipactis helleborine

DE: Breitblättrige Stendelwurz, Sitter

FR: épipactis à larges feuilles

EN: broad-leaved helleborine

🌸 (VI)VII-IX

CR EN VU NT **LC**



photo : Eric Threinen

D'Breetbliedereg Harespelorchidee ass déi heefegst Harespelorchideeën-Aart zu Lëtzebuerg. Si huet grouss gréng Blieder a wiisst virun allem duerch hir Photosynthese. Si kënn souwuel a lichte Laf- an Nolebëscher a laanscht deenen hire Rand vir, wéi och am Oppeland an op Dréchewues.





photo : Eric Threinen

MÜLLER-HARESPELORCHIDEE

Epipactis muelleri

DE: Müllers Stendelwurz

FR: épipactis de Müller

EN: Mueller's helleborine



CR EN VU NT LC

Bei de Bléie vun der Müller-Harespelorchidee feelen d'Läimkierper an hir Pollepäck zerfale scho kuerz nom Opbléien. Dëst deit op eng Upassung vun de Bléie fir sech selwer ze bestëbsen hin, obschonns et nach Nektar an de Bléie gëtt. Dës Aart kënnt am Guttland op kallekhaltege Standuerter op Lichtungen an um Rand vu Bëscher vir.





ROUDELZEG HARESPELORCHIDEE

Epipactis purpurata

DE: Violetter Sitter, Violette Stendelwurz

FR: épipactis pourpre

EN: violet helleborine



VIII-IX

CR

EN

VU

NT

LC

D'Roudelzeg Harespelorchidee ënnerscheet sech un aneren Harespelorchideeën duerch déi violett iwwerlaf Stiller a Blieder. Si ass eng vun den Harespelorchideeën, déi eng enk Verbindung mat Mykorrhiza-Pilzen ageet. Si wiest a schiedege Lafbëscher am südwestleche Guttland.





photo : Eric Threinen



SCHMUELLËPSEG HARESPELORCHIDEE

Epipactis leptochila

DE: Schmalllippige Stendelwurz, Sitter

FR: épipactis à lèvres étroites

EN: narrow-lipped helleborine



VII-VIII

CR

EN

VU

NT

LC

D'Schmuellëpseg Harespelorchidee läit a Blattform a Liewensweis tëschent den Harespelorchideeën-Aarten, déi staark op d'Versuergung duerch Mykorrhiza-Pilzen ugewise sinn an deenen Aarten, déi haaptsächlech duerch eeg Photosynthes wuessen. Si kennt op kallekräiche Standuerter an a schiedege Bichebëscher vir.



photo : Eric Threinen



KLENGBLIEDEREG HARESPELORCHIDEE

Epipactis microphylla

DE: Kleinblättrige Stendelwurz

FR: épipactis à petites feuilles

EN: small-leaved helleborine



VII

CR

EN

VU

NT

LC

D'Klengbliedereg Harespelorchidee bilt nëmme reduzéiert, schmuel Lafblieder aus an ass op d'Versuergung duerch hir Mykorrhiza-Pilzen ugewisen. Dës kleng a reng Aart wisst a schiedege kallekräiche Bichebëscher an op fräie Plaze wéi Bëschweeër. Si ass zu Lëtzebuerg ganz seelen.





KRAUCHEND NETZBLAT

Goodyera repens

DE: Kriechendes Netzblatt

FR: goodyère

EN: creeping lady's-tresses dwarf-rattlesnake plantain



VII-VIII

CR

EN

VU

NT

LC

D'Krauchend Netzblatt ass déi eenzeg Orchidee zu Lëtzebuerg, déi ëmmergréng Blieder mat vernetzte Blatodere bilt. Et wisst an nährstoffarme Kiferebëscher, do wou ze vill Nährstoffer sinn, gëtt et séier vu Grieser iwwerwuess a stierft of. D'Krauchend Netzblatt staamt ursprénglech aus méi kale Géigenden oder aus de Bierger an huet sech ugangs vum 20. Joerhonnert mat Kifereplanzunge verdeelt.




ORCHIDEEËVIRKOMMEN

OP DRÉCHEWUES (DRY)

Schiefergestein			unterer Lias
Bundsandstein			mittlerer Lias
Muschelkalk			oberer Lias
Keuper			Minette
nach 2005			vor 2005

AARTEN:

Anacamptis morio, *A. pyramidalis*,
Epipactis atrorubens, *Gymnadenia conopsea*,
G. odoratissima, *Herminium monorchis*,
Himantoglossum hircinum, *Neotinea tridentata*,
N. ustulata, *Ophrys apifera*, *O. holosericea*,
O. insectifera, *O. sphegodes*, *Orchis anthropophora*,
O. mascula, *O. militaris*, *O. purpurea*, *O. simia*





ÏWERLIEWE BEI DRËCHENT AN HËTZT

Vill Orchideeë stamen ursprénglech aus dem Mëttelmierraum a kennen déi extrem Standuerter op Dréchewues, mat ganz wéineg Nährstoffer, Waassermangel am Summer a staarken Temperaturschwankunge besidelen. Zu Lëtzebuerg kommen Orchideeën op dësen Zorte vun Dréchewues vir:

- Um Gebitt vun de fréieren Aerzofbau-Fläche sinn am Laf vun de leschte fofzeg Joer op den Dogger a Minette-Schichte sekundär aarteräich Kallek-Dréchewuess Standuerter entstan.
- Op Keuper-Dréchewues fënnt een déi aarteräichst Orchideeën-Standuerter. Si hunn sech virun allem op den Häng a Koppe vun der Keuperlandschaft gebilt.
- Dréchewues op Muschelkallek fënnt een um Südostrand vum Éislek an am Museldall. Am Éislek hunn sech op den no Süden ausgeriichten Häng vum Devonschifer Silikatmoerwise gebilt.



photo : Eric Threinen

DONKELROUT HARESPELORCHIDEE

Epipactis atrorubens

DE: Braunrote Stendelwurz

FR: épipactis pourpre noirâtre, épipactis brun rouge

EN: dark-red helleborine, royal helleborine

🌸 VI-VII

CR EN **VU** NT LC

Déi donkelrout Harespelorchidee lackelt hir Bestëbser mam Vanillsdoft vun hire Bléien un. Si wiisst op opgeschottem nährstoffaarme Gestengs wéi Strooseböschungen an a lichte Bëscher mat kallekhaltegem Buedem. Zu Lëtzebuerg kënnt déi donkelrout Harespelorchidee am Guttland besonnesch an de fréieren Dagebau-Gebidder am Süde vir.





BOCK-RIMMERZONG

Himantoglossum hircinum

DE: Bocks-Riemenzunge

FR: orchis bouc

EN: lizard orchid

🌸 V-VII

CR EN VU NT **LC**



photo : Eric Threinen

Mat hiren extrem verlängerte Bléielëpsen déi u Rimmer erënneren an hirem séisselzeg strenge Geroch no Geess ass déi stramm Bock-Rimmerzong eng vun den opfällegsten Orchideeë vu Lëtzebuerg. De Klimawandel vun de leschten dräi Joerzénge mat ëmmer méi waarme Sommertemperaturen a mëlle fiichte Wantere schéngt d'Ausbreedung vun dëser Aart aus Südwesteuropa ze begënschtegen.





photo : Sebastian Brandt

PYRAMIDEN-HONDSWUERZEL

Anacamptis pyramidalis

DE: Pyramiden-Spitzorchis, Pyramiden-Hundswurz

FR: épipactis pourpre noirâtre, épipactis brun rouge

EN: dark-red helleborine, royal helleborine

🌸 V-VIII

CR EN VU NT **LC**

An de Bléie vun der Pyramiden-Hondswuerzel gëtt et trotz der knalleger Faarf an dem laange Spuer fir d'Bestëbser keen Nektar ze huelen. D'Aart ass frou mat Kallek a kennt op sonnege Moerwisen an op Dréchewues vir. Si huet seech an de leschte Joerzénge zu Lëtzebuerg staark ausgebreet, ganz besonnesch an de fréieren Dagebau-Gebidder am Süden. Déi opfälleg Aart besidelt och gär opgeschotte Stroosseböschungen.





BOKEN-HONDSWUERZEL

Anacamptis morio

DE: Kleiner Narr, Kleines Knabenkraut

FR: orchis bouffon

EN: green-winged orchid



V-VI

CR

EN

VU

NT

LC

D'Boken-Hondswuerzel huet hiren Numm wéinst sengem violett mat gréng gefierfte Bléienhelm, deen un e Bok erënnert. Nach bis Ufanks vum 20. Joerhonnert war d'Boken-Hondswuerzel op moren Dréchewisen zu Lëtzebuerg heefeg. Wéinst der verstärkter Düngung an dem Verschwanne vun der traditioneller Beweedung mat Schof ass d'Aart haut vum Ausstierwe bedreet.





DRÄIZÄNN-BOUWEKRAUT

Neotinea tridentata

DE: Dreizähniges Knabenkraut

FR: orchis tridenté

EN: three-toothed orchid



IV-VI

RE

CR

EN

VU

NT

LC

D'Dräizänn-Bouwekraut verdankt säin Numm der Bléi mat engem Helm deen an dräi spatZ Zänn ausleeft. Et wisst op exponéiertem, ganz nidderegem Dréchewues op Kallekbiedem. Zu Lëtzebuerg ass et ausgestuerwen.





GESENGT-BOUWEKRAUT

Neotinea ustulata

DE: Brand-Knabenkraut

FR: orchis brûlé

EN: burnt orchid



V-VI

RE

CR

EN

VU

NT

LC

De Bléiestand vum Gesengte Bouwekraut wierkt mat senger schwaarzbronge Knospe wéi gesengt. Och des Aart vum sonnege kallekhaltegen Dréchewues ass haut zu Lëtzebuerg ausgestuerwen. Si kennt awer nach no un der Grenz um Orchideeëpad tëscht Mertert a Konz vir.





photo : Eric Threinen



HIERLENNER-FANGERWUERZEL

Dactylorhiza sambucina

DE: Holunder-Kuckucksblume

FR: orchis sureau

EN: elder-flowered orchid



IV-VII

RE

CR

EN

VU

NT

LC

D'Hielenner-Fangerwuerzel krut hiren Numm wéinst dem hielenneränlechen Doft vun hire Bléien. An eise Géigende kënn nëmme déi giel Faarfvariant vir, méi südlech fënnt een des och zesumme mat der roudere Faarfvariant an enger selwechter Populatioun. D'Hielenner-Fangerwuerzel wiest op sauere Biedem an dréchenen a frësche Wäsen a Moerwäsen, ass awer zu Lëtzebuerg scho laang ausgestuerwen.





BEIEN-APERHOERORCHIDEE

Ophrys apifera

DE: Bienen-Ragwurz

FR: ophrys abeille

EN: bee orchid



V-VI

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Eric Threinen

D'Bléie vun der Beien-Aperhoerorchidee imitéieren, wéi bei den Aperhoerorchideeën üblich, d'Ausgesi vu bestëmmten Insekten, déi si als Bestëbser ulackelen. Wann sech d'Pollinien a Richtung Narb bëien, kann d'Beien-Aperhoerorchidee sech awer och selwer, ouni Insektebesuch, bestëbsen. Bei eis ass dat d'Reegel. Si wisst op dréchenem waarme Kallekdréchewues am Guttland.





photo : Eric Theinen

BOMMELEN-APERHOERORCHIDEE

Ophrys holosericea

DE: Hummel-Ragwurz

FR: ophrys bourdon

EN: late spider orchid



V-VI

CR

EN

VU

NT

LC

D'Bléie vun der Bommelen-Aperhoerorchidee kënnen a Faarf a Form ganz variabel sinn an och Kielechblieder a verschiddene Faarwe sinn net seelen. D'Bommelen-Aperhoerorchidee wüsst op Kallekdréchewues am südlechen an ëstlechen Deel vum Land.





MÉCKEN-APERHOERORCHIDEE

Ophrys insectifera

DE: Fliegen-Ragwurz

FR: ophrys mouche

EN: fly orchid



CR EN VU **NT** LC



photo : Eric Threinen

D'Bléi vun der Mécken-Aperhoerorchidee imitéiert keng Méck, mee si täuscht déi männlech Aperhoerorchideeën-Zikadenharespele mat hirem Doft, deen dës iwwert Kilometere richte kënnen. Souguer d'Ausrichtung vun den Hoer op der Bléi entsprécht der vun engem Harespelsweibchen. D'Mécken-Aperhoerorchidee kënnt op dréchenem waarme Kallekdréchewues am Guttland vir.





SPANNEN-APERHOERORCHIDEE

Ophrys sphegodes

DE: Große Spinnen-Ragwurz

FR: ophrys araignée

EN: early spider-orchid



IV-VI

CR

EN

VU

NT

LC




photo : Eric Threinen

D'Lëps vun der Spannen-Aperhoerorchidee gläicht fir eis staark enger Spann, bestëbst ginn des Bléien awer vu Sandbeien. D'Spannen-Aperhoerorchidee kennt op dréchenem, sonnege Kallekdréchewues vir an ass di seelenst Aperhoerorchidee zu Lëtzebuerg.





MÉCKEN-HANDWUERZEL

Gymnadenia conopsea

DE: Mücken-Händelwurz

FR: ophrys bourdon

EN: late spider orchid



VI-VIII

CR

EN

VU

NT

LC

Gréisser Bestänn vun der Mécken-Handwuerzel bleiwe virun allem wéinst hirem wonnerbaren Doft an Erënnerung. Eng Mëschung aus Neelcheskapp a Vanill lackelt divers Insekte bei déi rosa-violett Bléiestänn. Awer nëmmen déi deenen hir Rüssele laang genuch sinn, kommen un den Nektar an deem enke Spuer. Déi schlank Mécken-Handwuerzel fënnt een zu Lëtzebuerg op Kallekdréchewues zimmlech heefeg.





photo : Eric Threinen

DOFTEG HANDWURZEL

Gymnadenia odoratissima

DE: Wohlriechende Händelwurz

FR: gymnadénie odorante

EN: short-spurred fragrant orchid



VI-VII

RE

CR

EN

VU

NT

LC

Déi Dofteg Handwuerzel ass méi reng an duerch hire méi kuerze Spuer vun der Mécken-Handwuerzel ze ënnerscheeden. Hir Bléie richen no Neelcheskapp. Zu Lëtzebuerg gouf et déi Aart op Kallekdréchewues, si gëllt awer méttlerweil als ausgestuerwen.





GAALGEMÄNNCHE- BOUWEKRAUT

Orchis anthropophora

DE: Hängende Männchen

FR: orchis homme-pendu

EN: man orchid



V-VII

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Eric Threinen

D'Bléielëpse vum Gaalgemännche-Bouwekraut erënneren un kleng mënschlech Silhouetten. Op Däitsch heescht si och nach "Ohnsporn" well d'Bléie kee Spuer hunn. Trotzdeem fannen d'Insekten an de Bléie räichlech Nektar. D'Gaalgemännche-Bouwekraut kënnt op sonnigem Kallekdréchewues am Guttland vir.





MAANS-BOUWEKRAUT

Orchis mascula

DE: Stattliches Knabenkraut, Männliches Knabenkraut

FR: orchis mâle

EN: early-purple orchid



V-VI



D'Nektar-Täuschbléie vum Maans-Bouwekraut bilde keen Nektar, si maachen awer a Faarf a Form d'Bléie vun aneren Nektarplanzen, déi zur selwechter Zäit bléien, no fir Bestëbser-Insekten unzelackelen. Dat ass eng wäit verbreeten a ganz erfollegräich Strategie vun den Orchideeë fir bestëbst ze ginn. D'Maans-Bouwekraut wisst a Moerwisen an um Bëschrang an ass am ganze Land zimmlech verbreet.





ZALDOTE-BOUWEKRAUT

Orchis militaris

DE: Helm-Knabenkraut

FR: orchis militaire

EN: military orchid



V-VI

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Eric Threinen

D'Zaldote-Bouwekraut verdankt säin Numm der Form vu senge Bléieblieder, déi zum Deel matenee verwuesse sinn an dofir wéi en Helm ausgesinn. Et wisst op Kallekdréchewues an a lichte Bëscher am Guttland.





PURPURROUT BOUWEKRAUT

Orchis purpurea

DE: Purpur-Knabenkraut

FR: orchis pourpre

EN: lady orchid



V-VI

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Eric Threlken

Déi baussenzeg Bléieblieder vum Purpurroude Bouwekraut si purpurROUT gefierft a ginn de Bléien hiert typescht zweefaarwegt Ausgesinn. Des Aart ass op kallekhaltegem Dréchewuess am Guttland zimmlech heefeg.





Afe-Bouwekraut

Orchis simia

DE: Affen-Knabenkraut

FR: orchis singe

EN: monkey orchid



V-VI

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Eric Threinen

D'Bléielëps vum Afe-Bouwekraut erënnert mat hire véier laange Glidder un een Af. Des Aart huet als ausgestuerwe gegollet, gouf awer rezent erëm gesinn. Si kennt op sonnegen Häng a lichte Gesträich op kallekhaltege Biedem am Guttland vir.





EENZELKNOLL-HUNNEGORCHIDEE

Herminium monorchis

DE: Einknollige Honigorchis

FR: orchis musc

EN: musk orchid



VI-VII

RE

CR

EN

VU

NT

LC

photo : Eric Threinen




D'Eenzelknoll-Hunnegorchidee verdankt hiren Numm der eenzeger Knoll, déi si als Späicherorgan huet. Dës gëtt eréischt no der Bléi um Enn vun ënnerierdeschen Ausleefer gebilt an net wéi bei den Aarte vun der Gattung Orchis nieft der aler Knoll. Wéi vill aner Orchideeë vun den nährstoffarmen naasse Wäsen ass och d'Eenzelknoll-Hunnegorchidee säit laangem zu Lëtzebuerg ausgestuerwen.



ORCHIDEEËVIRKOMMEN

A FIICHTEN A MOERE WISEN (MAR)



ORCHIDEEËN ODER DÜNGER

Eis struktuurriich Kulturlandschaft bitt mat hire ganz ënnerschiddleche Gréngland-Liewensraim villen Déieren- a Planzenaarten eng Plaz an ass duerch traditionell Bewirtschaftungsformen entstan. An Zäite vun der industrieller Landwirtschaft sinn dat traditionellt Méie fir Hee an déi reegelméisseg Beweedung vun ertragsarme Gréngland genau sou wéi de kléngdeelegen Akerbau um Verschwannen. Besonnesch duerch déi mineralesch Düngung ass de Bestand vun deene villfältege Liewensraim mat hiren typeschen Aarte staark bedréit.

- Staunaass Fiichtwisen entsti virun allem am Guttland iwwer onduerchlässege Biedem mat engem héije Leem-Undeel, wou d'Waasser net a méi déif Buedemschichte ka versickeren.
- Am Éislek fannen sech Fiichtwise laanscht déi kleng Baachen an den Däller oder bei Quellen am Hank. Déi sauer, mineralaarm Biedem enthale manner Leem a si méi duerchlässege wéi am Guttland.
- Moer Wisen op nährstoffarme Biedem hunn nëmme bei traditioneller Hee-Notzung Bestand. Si gehéieren aktuell zu den am meeschte bedreete Liewensraim zu Lëtzebuerg.



GRÉNG FANGERWUERZEL

Dactylorhiza viridis

DE: Grüne Hohlzunge, Grüne Fingerwurz

FR: orchis grenouille

EN: frog orchid



VI-VII

CR

EN

VU

NT

LC



A Wisen, déi wéinst feelender oder net gëeegenter Notzung verfilzen a verbusche gëtt déi konkurrenzschaach Gréng Fangerwuerzel séier verdrängt. Zu Lëtzebuerg koum si nëmmen op ganz kuerze more Wisen, op Dréchewues an a lichte Bëscher vir. Et kann een si just nach op engem Standuert am Südweste vum Land fannen.





photo : Sebastian Brandt

SUPPEN-HARESPELORCHIDEE

Epipactis palustris

DE: Sumpfsitter, Sumpf-Stendelwurz

FR: épipactis des marais

EN: marsh helleborine



VI-VIII

CR

EN

VU

NT

LC

D'Bléie vun der Suppen-Harespelorchidee hu vill Nektar, mat deem si eng Abberzuel vu Bestëbser ulackelen. Hire Som ass am Verglach mat aneren Orchideeën-Aarte grouss a verbreet sech gutt, well en um Waasser schwëmmt. D'Suppen-Harespelorchidee wiest a suppege Wäsen an a Mueren. Et gëtt nëmmen nach ganz e puer rezent Virkommen, besonnesch laanscht d'Westgrenz vu Lëtzebuerg.





photo: Karl Kreuz



WANZEN-HONDSWUERZEL

Anacamptis coriophora

DE: Wanzen-Knabenkraut

FR: orchis punaise

EN: bug orchid



VI-VII

RE CR EN VU NT LC

D'Wanzen-Hondswuerzel krut hiren Numm wéinst deem desagreabele Geroch no Wanzen. Et konnt een si am 19. Joerhonnert a more kallekräiche Fiichtwisen "zimmlech heefeg" fannen. Leider gelt si méttlerweil scho laang als ausgestuerwen.





photo : Eric Threinen

SUPPEN-HONDSWUERZEL

Anacamptis palustris

DE: Sumpf-Hundswurz

FR: orchis des marais

EN: bog orchid



V-VII

RE

CR

EN

VU

NT


LC

Zwee Beleege am Herbar vum Musée bezeien d'Virkomme vun dëser Aart zu Lëtzebuerg um Enn vum 19. Joerhonnert. Ofgesinn dovun si keng weider Virkomme vun der Suppen-Hondswuerzel zu Lëtzebuerg dokumentéiert. Si ass virun allem a Südost-Europa verbreet, kënnt zerstreet a Frankräich an op e puer Plazen an der Pfalz vir.





photo : Eric Threinen



BREETBLIEDEREG FANGERWUERZEL

Dactylorhiza majalis

DE: Breitblättrige Kuckucksblume, Breitblättrige Fingerwurz

FR: dactylorhize à larges feuilles

EN: broad-leaved marsh orchid



V-VI

CR

EN

VU

NT

LC

D'Bléie vun der Breetbliedereger Fangerwuerzel kënnen, sou wéi bei anere Fangerwuerzel-Aarten och, ganz variabel sinn. Déi Breetbliedereg Fangerwuerzel kann een an nährstoffarmen, fiichte bis suppege Wäsen am ganze Land fannen. Do wou si nach wäisst, bilt si dacks zimmlech grouss Populatiounen.





GEFLECKT FANGERWUERZEL

Dactylorhiza maculata

DE: Gefleckte Fingerwurz, Geflecktes Knabenkraut

FR: dactylorhize tacheté

EN: moorland spotted orchid



VI-VII

CR

EN

VU

NT

LC



photo : Eric Threinen

Déi Gefleckt Fangerwuerzel kann sech mat anere Fangerwuerzel-Aarten, déi no Famill sinn, kräizen an Hybride bilden. Si kënn op fiichte Wäsen a Lichtungen am Bësch mat sauerem bis neutrale Buedem besonnesch am Éislek awer och am Guttland fir.





FUCHS-FANGERWUERZEL

Dactylorhiza fuchsii

DE: Fuchs-Kuckucksblume

FR: dactylorhize de Fuchs

EN: Fuchs-marsh orchid, common spotted orchid

🌸 VI-VII

CR EN **VU** NT LC



photo : Eric Threinen

D'Fuchs-Fangerwuerzel gläicht der Gefleckter Fangerwuerzel ganz vill, önnerscheet sech awer duerch d'Form an d'Zeechnung vun der Lëps. Och wisst si net op saueren, ma op kallekhaltege Biedem a fiichte bis dréchene Wäsen, a lichte Bëscher a Bëschränner besonnesch am Guttland vir.





photo : Eric Threinen



FLEESCHROUT FANGERWUERZEL

Dactylorhiza incarnata

DE: Fleischfarbene Kuckucksblume, Fleischfarbener Fingerwurz

FR: orchis incarnat

EN: early marsh orchid



V-VI

CR

EN

VU

NT

LC

D'Mierkmoler vun der Fleeschrouder Fangerwuerzel kënne ganz villfälteg sinn. Et kann een si awer um ieweschte Lafblatt erkennen, dat am Ufank vun der Bléi iwver de Bléiestand kann erausstoën. Di Fleeschrout Fangerwuerzel wiest a kallekhaltege fiichte bis suppege Wäsen a Flaachmoueren am Guttland an am Éislek.





photo : Eric Threinen



CUNGS' FLEESCHROUT FANGERWUERZEL

Dactylorhiza incarnata ssp. cungsii

DE: Cungs' Fleischfarbene Fingerwurz

FR: dactylorhize incarnat de Cungs

EN: Cungs' early marsh-orchid



D'Cungs' Fleeschrout Fangerwuerzel ass eng ganz besonnesch Seelenheet. Si gouf eréischt 2016 beschriwwen an ass eng endemesch Ënneraart fir Lëtzebuerg. Et gëtt si just op engem eenzege Standuert an engem staunaassen, ganz fiichte Beräich vum Naturschutzgebitt Kiemercher.





photo : Eric Threinen

VERNOLÉISSEGT FANGERWUERZEL

Dactylorhiza praetermissa

DE: Übersehene Fingerwurz

FR: orchis négligé

EN: southern marsh orchid



VI-VII

CR

EN

VU

NT

LC

Déi Vernoléisseg Fangerwuerzel gouf laang net vun der zimmlech änlecher Fleeschrouder Fangerwuerzel ënnerscheet. Si wisst normalerweis a fiichte bis suppege Wäsen an a Flaachmoueren. Zu Lëtzebuerg kennt si och an de fréieren Dagebaugebitt vir. Des Aart huet eng ausgepräugt atlantesch Verbreedung a Lëtzebuerg läit un der Ostgrenz vun hirem Verbreedungsgebitt.



LËSCHT

LËSCHT VUN DE WËLLWUESSENDE ORCHIDEEËN ZU LËTZEBUERG

	RL-Statut	Habitat	Säit
<i>Anacamptis coriophora</i>	RE	MAR	98
<i>Anacamptis morio</i>	CR	DRY	60
<i>Anacamptis palustris</i>	RE	MAR	100
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	LC	DRY	58
<i>Cephalanthera damasonium</i>	LC	FOR	34
<i>Cephalanthera longifolia</i>	VU	FOR	36
<i>Cephalanthera rubra</i>	EN	FOR	38
<i>Cypripedium calceolus</i>	RE	FOR	28
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	VU	MAR	106
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	EN	MAR	108
<i>Dactylorhiza incarnata ssp. cunghii</i>	CR	MAR	110
<i>Dactylorhiza maculata</i>	LC	DRY	104
<i>Dactylorhiza majalis</i>	LC	MAR	102
<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	EN	MAR	112
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	RE	DRY	66
<i>Dactylorhiza viridis</i>	CR	DRY	94
<i>Epipactis atrorubens</i>	VU	DRY	54
<i>Epipactis helleborine</i>	LC	FOR	40
<i>Epipactis leptochila</i>	CR	FOR	46
<i>Epipactis microphylla</i>	CR	FOR	48
<i>Epipactis muelleri</i>	EN	FOR	42
<i>Epipactis palustris</i>	EN	MAR	96
<i>Epipactis pupurata</i>	EN	FOR	44



	RL-Statut	Habitat	Säit
<i>Epipogium aphyllum</i>	CR	FOR	24
<i>Goodyera repens</i>	/	FOR	50
<i>Gymnadenia conopsea</i>	LC	DRY	76
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	RE	DRY	78
<i>Herminium monorchis</i>	RE	DRY	90
<i>Himantoglossum hircinum</i>	LC	DRY	56
<i>Limodorum abortivum</i>	RE	FOR	26
<i>Neotinea tridentata</i>	RE	DRY	62
<i>Neotinea ustulata</i>	RE	DRY	64
<i>Neottia nidus-avis</i>	LC	FOR	22
<i>Neottia ovata</i>	LC	FOR	20
<i>Ophrys apifera</i>	LC	DRY	68
<i>Ophrys holosericea</i>	NT	DRY	70
<i>Ophrys insectifera</i>	NT	DRY	72
<i>Ophrys sphegodes</i>	CR	DRY	74
<i>Orchis anthropophora</i>	NT	DRY	80
<i>Orchis mascula</i>	LC	DRY	82
<i>Orchis militaris</i>	NT	DRY	84
<i>Orchis purpurea</i>	LC	FOR	86
<i>Orchis simia</i>	CR	DRY	8
<i>Platanthera bifolia</i>	LC	FOR	30
<i>Platanthera chlorantha</i>	LC	FOR	32

BIBLIOGRAPHIE

Arbeitskreis Heimische Orchideen Rheinland-Pfalz/Saarland (Hrsg.) (2021) **Die wildwachsenden Orchideen in Rheinland-Pfalz** und im Saarland. Langenfeld.

Brandt S. (2021) **Juwelen der Natur. Orchideen in Thüringen**. Naturkundemuseum Erfurt. Begleitkatalog zur Ausstellung 2021. Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V., Erfurt.

Colling G. (2005) **Red List of the Vascular Plants of Luxembourg**. Ferrantia 42. Musée national d'histoire naturelle, Luxembourg.

Colling G. et al. (in prep.) **Red List of the Vascular Plants of Luxembourg**.

Kreutz C.A.J. **Orchideeën van de Benelux**. (2019) Kreutz Publishers (Sint Geertruid, Nederlands).

Lambinon J. & F. Verloove (coll. L. Delvosalle, B. Toussaint, D. Geerinck, I. Hoste, F. Van Rossum, B. Cornier, R. Schumacker, A. Vanderpoorten & H. Vannerom). **Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines** (Ptéridophytes et Spermatophytes). Sixième édition, deuxième tirage, avec corrections (2015). Edition du Jardin botanique Meise (Meise, Belgique).

Mangen J.-M., G. Colling, J. Massard, E. Medernach. **Die Orchideen Luxemburgs**. 2. neubearbeitete Auflage (1997). Musée National d'Histoire Naturelle, Société des Naturalistes Luxembourgeois.

MNHNL, 2000-. **Recorder-Lux**, database on the natural heritage of the Grand Duchy of Luxembourg. National Museum of Natural History, Luxembourg. [mdata.mnhn.lu]

Nogret J.-Y. , A. Simon, S. Vitzthum (2016) **À la découverte des orchidées sauvages de Lorraine**. Éditions du Quotidien, Strasbourg.

IMPRESSUM

Täuschend echt! Wëll Orchideeën zu Lëtzebuerg

Katalog zur Ausstellung mam selwechte Numm

Laura Daco & Thierry Helminger 2023

lwwersetzung: Thierry Helminger

Layout: Anita Faber, Romain Bei

Fotoe Modeller : Eric Threinen, Sebastian Brandt

Fotoe : Sebastian Brandt, Guy Conrady, Nathalie Grotz, Jan Herr, Wolfgang Hock,
Alain Hoffmann, Karel Kreutz, Yves Krippel, Max Lauff, Fernand Lommer, Marianne Majerus,
Jean-Marie Mangen, Jim Meisch, Georges Moes, Mikka Mootz, Ronny Mozek,
Simone Schneider, Eric Threinen, Jean-Paul Wolff, Peter Zschunke, Shutterstock

Musée national d'histoire naturelle Luxembourg

